

# Que es Vacío de tratamiento con bomba?

## El uso diario de la terapia de vacío para extraer la sangre en el pene.

- ✓ Estira el tejido y tira oxigenada sangre en el pene.
- ✓ Reemplazado naturalmente erecciones nocturnas.

La punta del pene se coloca en la abertura del tubo y se crea un sello hermético al aire contra la piel.

La bomba de vacío extrae el aire fuera del tubo, dibujo del pene en el tubo, que se extiende el tejido y la sangre en el pene. Este proceso crea una erección.



## Vacuum protocolo de terapia Muestra

**Compromiso de tiempo:** 10 minutos al día, 3-5 veces a la semana

**Objetivo:** Crear y mantener erecciones múltiples dentro de un periodo de 10 minutos. Cada montaje se llevará a cabo durante un minuto. **No utilizar anillos de constricción para la terapia de vacío a diario.**

Continuar el tratamiento hasta que experimenta erecciones nocturnas regulares o erecciones espontáneas durante el día, o consulte a su médico para obtener instrucciones más específicas sobre un punto de parada.

## Tres sencillos pasos:

### ▶ PASO 1

Utilice la bomba de vacío para crear la mayor cantidad de una erección tan cómodo. Al principio será incómodo, especialmente si ha pasado un tiempo desde que has tenido una erección saludable.



### ▶ PASO 2

Mantener la erección durante 1 minuto. Después de que el minuto se ha terminado, liberar el vacío. Esto hará que la sangre fluya fuera del pene y de nuevo en su cuerpo.

### ▶ PASO 3

Repita los pasos 1 y 2 hasta que han alcanzado un total de 3-5 erecciones en aproximadamente un período de 10 a 15 minutos.

## Una estrategia Disfunción Eréctil Muestra

### Meses 1-3

#### Objetivos clínicos

**Reemplace** las erecciones nocturnas y mantener el tejido del pene saludable

Preservar el tamaño del pene  
Mantener una buena salud sexual

#### Pasos para lograr sus objetivos

Dosis de la medicación oral de ED metas diarias si es prescrito por el médico

- 3-5 veces a la semana de terapia de vacío (sin anillos de constricción)
- Relaciones intento por semana usando la bomba de vacío o considerar la Viberect.

### Meses 4-6

#### Objetivos clínicos

**Retorno** de las erecciones espontáneas o responder a los medicamentos orales

Preservar el tamaño del pene  
Mantener una buena salud sexual

#### Pasos para lograr sus objetivos

Aumentar / disminuir orales dosificación de la medicación según sea necesario

- Continuar con la terapia de vacío
- Discutir las terapias adicionales con su médico
- Tiempos Coito 1-2 a la semana utilizando la bomba de vacío o utilice el Viberect.

Siempre consulte a su médico para el diagnóstico y manejo de la disfunción eréctil apropiado. Otros diagnóstico podría incluir Peyronie y tendrá un protocolo diferente.